



TOP 3000

ENGRAIS ORGANIQUE ENTIEREMENT D'ORIGINE VEGETALE NF U42-001 Vinasse de Mélasse NK 2-0-13 avec SO₃ (6)

UTILISATIONS

Engrais foliaire. Utilisation sur toutes les cultures.

MODE D'EMPLOI

Dosage : TOP 3000 s'utilise de 2 à 10 Litres / Ha selon la culture et l'objectif à atteindre.

Dilution maxi : TOP 3000 est à diluer dans maximum 200 Litres d'eau/Ha.

Période d'application : début de cycle.

Exemples : colza : septembre – maïs (4 à 6 feuilles) : fin avril – début mai.

CARACTERISTIQUES

Valeurs typiques à titre indicatif :

Aspect :	liquide jaune à brun
Odeur :	caractéristique intensive
Densité :	1,2 +/- 0,1
pH :	9 +/- 1
Hydrosolubilité :	soluble dans l'eau
Stockage:	crainit le gel
Classements CLP:	Sans

Teneurs :

- **Azote (N) : N total = 2 %**, soit 2,4 kg/100L à 20°C, dont 2% de protamélasse de pomme de terre,
- **Oxyde de Potassium (K₂O) : K₂O total = 13 %**, soit 15,6 kg/100L à 20°C, dont 13 % K₂O soluble dans l'eau,
- **Anhydride Sulfurique (SO₃) : SO₃ total = 6 %** soit 7,2 kg/100L à 20°C, soit 7,2 kg /100L à 20°C.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Recommandations : TOP 3000 doit être incorporé en premier dans les mélanges (sauf si un fabricant préconise que son produit doit être incorporé en premier) ; dans ce cas, TOP 3000 sera incorporé juste après ce premier produit. Pour toute nouvelle bouillie avec TOP 3000, il est préférable de faire un essai de compatibilité au préalable. Dans tous les cas, bien mélanger avant chaque emploi. Pour toute bouillie appliquée sur culture, le pH final doit être compris entre 3 et 10. En dehors de cette plage de pH, l'application est fortement déconseillée.

NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non-conforme à nos instructions.

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes.

Quelques références complémentaires :

CCF TKPP

