

PÂTE A RATS BRODIFACOUM

PÂTE FRAÎCHE RODENTICIDE POUR PROFESSIONNELS

AVANTAGES

Appât Rodenticide anticoagulant en pâte. Prêt à l'emploi. **Agit rapidement.**

UTILISATIONS

PÂTE A RATS BRODIFACOUM est destiné à être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments privés, publics et agricoles, aux abords des infrastructures, dans les décharges et déchetteries **contre les rats et les souris domestiques**. Produit à utiliser sur les organismes cibles du stade juvénile au stade adulte.

MODE D'EMPLOI

PÂTE A RATS BRODIFACOUM ne peut être utilisé que dans des postes d'appâtage sécurisés tels que **TUNNEL A RATS** et **TUNNEL SO**.

Dose(s) et fréquence(s) d'application :

Professionnels	Contre les rats	Forte Infestation	180 g d'appât par point d'appât espacés de 5 mètres.
		Faible Infestation	180 g d'appât par point d'appât espacés de 10 mètres.
	Contre les souris	Forte Infestation	30 g d'appât par point d'appât espacés de 1 mètre.
		Faible Infestation	30 g d'appât par point d'appât espacés de 2 mètres.

Respecter les doses d'application du produit et les intervalles entre les postes d'appâtage.

Les **postes d'appâtage doivent être inspectés** tous les 2 à 3 jours (*pour le traitement contre les souris*) ou 5 à 7 jours (*pour le traitement contre les rats*) après le début du traitement, puis au moins une fois par semaine par la suite, dans le but de **vérifier si l'appât est accepté** et si les postes d'appâtage **sont intacts** et de **retirer les cadavres** de rongeurs.

Rechargez le poste d'appâtage **au besoin**. Envisager l'adoption de mesures de lutte préventives (*combler les trous, retirer autant que possible les aliments et boissons éventuels, ...*) pour **améliorer l'ingestion** du produit et **réduire le risque** de nouvelle infestation.

Pour réduire le risque d'empoisonnement secondaire, chercher et **retirer régulièrement les cadavres** de rongeurs pendant la période de traitement. Ne pas utiliser le produit en guise d'appât permanent pour éviter l'invasion de rongeurs ou surveiller les activités des rongeurs. Ne pas utiliser le produit dans le cadre de traitements par appâtage pulsé. Protéger l'appât des conditions atmosphériques.

Placer les points d'appât dans des **endroits qui ne risquent pas d'être inondés**. Remplacer tout appât qui a été altéré par l'eau ou contaminé par des saletés. Ne pas placer directement ce produit dans les terriers. Lorsque des points d'appât sont placés à proximité de systèmes d'évacuation des eaux, s'assurer que l'appât n'entre pas en contact avec l'eau. Retirer tout produit restant au terme de la période de traitement. Pour l'utilisation à l'extérieur, les points d'appâtage doivent être couverts et placés dans des sites permettant de minimiser l'exposition des espèces non cibles.

Lire et respecter les informations sur le produit ainsi que toutes les informations qui accompagnent le produit ou celles fournies sur le point de vente avant de l'utiliser. Avant de placer un appât, faire un diagnostic préalable et une évaluation sur site de la zone infestée pour **identifier les espèces de rongeurs**, leurs lieux d'activité et déterminer la cause probable ainsi que l'ampleur de l'infestation. **Retirer toute nourriture** facilement accessible pour les rongeurs (*par exemple, des céréales éparpillées ou des déchets alimentaires*). Ne **pas nettoyer la zone infestée** avant le traitement car cela perturbe la population des rongeurs et rend l'acceptation de l'appât plus difficile.

PÂTE A RATS BRODIFACOUM

(Suite)

PÂTE A RATS BRODIFACOUM ne doit être utilisé que dans le cadre d'un système de lutte intégrée incluant notamment des mesures d'hygiène et, si possible, des méthodes physiques de contrôle. **PÂTE A RATS BRODIFACOUM** doit être placé à proximité immédiate des endroits où une activité de rongeurs a été observée (*par exemple, parcours, sites de nidification, parcs d'engraissement, trous, terriers, etc.*).

Les postes d'appâtage doivent, si possible, être fixés au sol ou à d'autres structures. Ils doivent être clairement étiquetés pour indiquer qu'ils contiennent des rodenticide et qu'ils ne doivent être ni déplacés ni ouverts. Lorsque **PÂTE A RATS BRODIFACOUM** est utilisé dans des lieux publics, les zones traitées doivent être signalées pendant la période de traitement et une note expliquant le risque d'empoisonnement primaire ou secondaire par l'anticoagulant ainsi que les premières mesures à adopter en cas d'empoisonnement doit être apposée à proximité des appâts. L'appât doit être sécurisé de façon à ce qu'il ne puisse pas être déplacé à l'extérieur du poste d'appâtage.

Placer **PÂTE A RATS BRODIFACOUM** hors de la portée des enfants, oiseaux, animaux domestiques, animaux d'élevage et autres animaux non cibles. Placer **PÂTE A RATS BRODIFACOUM** à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux, ainsi que des ustensiles ou des surfaces entrant en contact avec ces derniers. Porter des gants de protection résistants aux produits chimiques pendant la phase de manipulation du produit. Ne pas manger, boire, ni fumer lors de l'utilisation du produit. Se laver les mains et toute zone de la peau directement exposée après avoir utilisé **PÂTE A RATS BRODIFACOUM**.

Si la consommation de l'appât est faible par rapport à l'étendue apparente de l'infestation, envisager de placer des postes d'appâtage à d'autres endroits et d'opter pour une autre formulation d'appât. Si, après une période de traitement de 35 jours, les appâts continuent d'être consommés et qu'aucune réduction de l'activité des rongeurs n'est observée, il convient d'en déterminer la cause probable.

Si d'autres éléments ont été exclus, il est probable que vous ayez affaire à des rongeurs résistants: dans ce cas, envisager l'utilisation d'un rodenticide non anticoagulant, le cas échéant, ou d'un rodenticide anticoagulant plus puissant. Envisager également l'utilisation de pièges à titre de mesure de contrôle alternative. Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât.

Si possible, avant tout traitement, informer les passants éventuels (*par exemple, les usagers de la zone traitée et ses environs*) de la campagne de dératisation. Les informations sur le produit doivent indiquer clairement que le produit ne doit être délivré qu'à des utilisateurs professionnels formés, disposant d'une certification attestant qu'ils respectent les exigences applicables en matière de formation. Ne pas utiliser dans des zones où l'on peut suspecter une résistance à la substance active.

Les produits ne doivent pas être utilisés au-delà de 35 jours sans évaluation du statut de l'infestation et de l'efficacité du traitement.

Ne pas alterner l'utilisation de différents anticoagulants d'efficacité comparable ou inférieure aux fins de la gestion de la résistance. Pour une utilisation alternée, envisager l'utilisation d'un rodenticide non anticoagulant, si disponible, ou d'un anticoagulant plus puissant.

Ne pas laver à l'eau les postes d'appâtage entre les applications ou les ustensiles utilisés dans les postes d'appâtage. Éliminer les cadavres des rongeurs dans un circuit de collecte approprié.

Chaque poste d'appâtage doit être muni d'une étiquette mentionnant les informations suivantes : « ne pas déplacer ni ouvrir » ; « contient un rodenticide » ; « Nom du produit ou numéro d'autorisation » ; « Substance(s) active(s) » et « en cas d'incident, contacter un centre antipoison INRS 01 45 42 59 59 ». Dangereux pour la faune.

PÂTE A RATS BRODIFACOUM

(Suite)

Une fois le traitement terminé, mettre au rebut l'appât qui n'a pas été mangé ainsi que l'emballage, dans un circuit de collecte approprié. Conserver le produit dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Maintenir le contenant bien fermé et à l'abri de toute exposition directe au soleil. Entreposer le produit hors de la portée des enfants, oiseaux, animaux domestiques et animaux d'élevage.

En raison de leur mode d'action retardé, les rodenticides anticoagulants agissent entre 4 et 10 jours après consommation de l'appât. Les rongeurs peuvent être porteurs de maladies. Ne pas toucher les cadavres de rongeurs à mains nues. **Porter des gants** ou utiliser des instruments tels que des pinces pour les éliminer. Ce produit contient un agent amérisant et un colorant.

CARACTERISTIQUES

Aspect : pâte molle bleue.

Présentation : sachets individuels en papier thermo scellés, dans un contenant de 5 kg.

Principaux composants : 0,005% de Brodifacoum et 0,005% de Dénatonium benzoate.

Homologué : sous le nom de FANGA PATE PRO n° FR-2014-0130 de Triplan – Andorre.

Mention d'avertissement : DANGER

Classements CLP : SGH08



PRECAUTIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement.

PÂTE A RATS BRODIFACOUM contient une substance anticoagulante. En cas d'ingestion, parmi les symptômes pouvant apparaître, parfois avec un certain retard, figurent des saignements de nez et des saignements gingivaux. Dans certains cas graves, des contusions et la présence de sang dans les selles ou les urines peuvent être observées.

ANTIDOTE : administrer de la vitamine K1 par du personnel médical / vétérinaire uniquement.

En cas d'exposition cutanée, nettoyer la peau à l'eau puis à l'eau savonneuse. **En cas d'exposition oculaire**, rincer les yeux avec une solution de rinçage oculaire ou de l'eau en gardant les paupières ouvertes au moins 10 minutes. **En cas d'exposition orale**, rincer soigneusement la bouche avec de l'eau.

En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin et présentez-lui le contenant du produit ou l'étiquette. Contacter un vétérinaire en cas d'ingestion par un animal domestique.

En cas d'incident, contacter le 15 (ou 112).

Centre antipoison : INRS 01 45 42 59 59.

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes.

NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

Quelques références complémentaires :

AR 3000 ♦ TUNNEL A RATS ♦ TUNNEL SO